

Πόσα χρόνια είναι ασφαλής η λήψη διφωσφονικών;

2010-06-19 21:22:45

Είναι γεγονός πως τα διφωσφονικά φάρμακα αποτέλεσαν και αποτελούν φάρμακα 1ης επιλογής στην αντιμετώπιση της Οστεοπόρωσης

Τα διφωσφονικά (Παμιδρονάτη, Αλενδρονάτη, Ριζεδρονάτη, Ιμπαδρονάτη, Ζολενδρονάτη). Αναστέλλουν την οστική απώλεια καταστρέφοντας τους οστεοκλάστες. Τα διφωσφονικά απορροφώνται πολύ δύσκολα από το έντερο, για το λόγο δε αυτό απαιτείται να λαμβάνονται με άδειο στομάχι και μεγάλη ποσότητα νερού. Η ανοχή στα διφωσφονικά έχει βελτιωθεί ακόμα περισσότερο με την εβδομαδιαία χορήγηση της αλενδρονάτης και ριζεδρονάτης αλλά και τη μηνιαία της ιμπαδρονάτης και πρόσφατα της ριζεδρονάτης. Το τελευταίο διάστημα, όπου υπάρχει η ανάλογη ένδειξη, χρησιμοποιούμε και ενδοφλεβίως διφωσφονικά σε σχήματα ετήσια και τριμηνιαία. Οι ενδοφλέβιες αυτές θεραπευτικές παρεμβάσεις έχουν βελτιώσει σημαντικά τη συμμόρφωση των ασθενών στη θεραπεία. Όλα τα διφωσφονικά μειώνουν την πιθανότητα κατάγματος στη σπονδυλική στήλη και το ισχίο.

Πόσα χρόνια όμως είναι ασφαλής η λήψη τους;

Διαβάστε από το παρακάτω link μια μελέτη που μόλις δημοσιεύτηκε

http://www.dovepress.com/articles.php?article_id=4871

Share / Save 